

POR UM NÚCLEO DE ATENDIMENTO CLÍNICO A PESSOAS EM RISCO DE SUICÍDIO: UMA ANÁLISE FENOMENOLÓGICA DO ATO DE DECIDIR PÔR FIM À VIDA

Ana Maria Lopez Calvo de Feijoo
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Ana.maria.feijoo@gmail.com

Resumo

Com esta pesquisa pretendemos criar um núcleo de atendimento psicológico a pessoas em risco de suicídio. Para tanto, iniciamos por uma revisão narrativa da literatura sobre o tema de modo a buscar, levantar, reunir e sintetizar os resultados de estudos publicados entre os anos 2012 e 2015, resultados esses que versam sobre o suicídio em relação à psicopatologia, à prevenção, ao sofrimento, ao desespero e aos núcleos de atendimento e à fenomenologia. A análise fenomenológica do ato de decidir pôr fim à vida se deu por meio daquilo que nos disseram aqueles que pensam em suicídio, em suas diferentes etapas: a redução fenomenológica; a descrição dos vetores internos ao fenômeno; e a explicitação das experiências. Concluímos que antes de cometer o suicídio algumas pessoas procuram por ajuda, o que justifica a pertinência e a urgência da criação de núcleos de atendimento clínico com psicólogos devidamente preparados para a lida com essa situação.

Palavras-chave: Suicídio; Psicoterapia; Método fenomenológico.

TOWARD A CLINICAL CARE CENTER FOR PEOPLE AT RISK OF SUICIDE: THE PHENOMENOLOGICAL ANALYSES OF THE DECISION TO END THE LIFE

Abstract

This investigation pretends to create of a psychological service center for people who have risk of suicide. Therefore, we started by a narrative review of the literature on the subject in order to seek, raise, gather and synthesize the study's results published between 2012 and 2015. These results relate to suicide in relation to psychopathology, suffering, despair, prevention, attendance center and phenomenology. The phenomenological analyses of the decision to end the life in theirs different stages are: the phenomenological reduction, the description of internal vectors of the phenomenon and the explanation of the experience. We concluded that before committing suicide some people look for help, which justifies the relevance and urgency of creating clinical care centers with psychologists properly prepared to deal with this situation.

Keywords: Suicide; Psychotherapy; Phenomenological method.